

HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS



EL POR QUÉ DE SU IMPORTANCIA

- **Porque acredita la SEGURIDAD ALIMENTARIA**
 - Menor nº de enfermedades
 - Menor uso de antibióticos
- **Porque minimiza el riesgo de contagio de enfermedades**
 - entre los animales
 - entre los animales y el hombre

MINIMAS ACTUACIONES EN CUESTIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

- **SOBRE LAS EXPLOTACIONES**
- **SOBRE LOS ANIMALES**
- **SOBRE HABITOS DE MANEJO**

SOBRE LAS EXPLOTACIONES

- **MEJORA CONTINUA DE LAS INSTALACIONES**

- **Porque aminora el trabajo**
- **Aumenta la comodidad**
- **Y, por lo tanto, disminuyen los riesgos**

- **LIMPIEZA Y DESINFECCION**

- Realizada como mínimo cada 3 o 4 meses
- Realización del sistema “todo dentro-todo fuera”, especialmente en el sector porcino

- **ENCALAMIENTOS FRECUENTES**

- Principalmente antes y después de cada paridera, especialmente en rumiantes

The background of the slide features several slices of citrus fruit, likely oranges or lemons, arranged in a circular pattern. A large, detailed image of a beetle is positioned on the right side of the slide, partially overlapping the text.

• **DESINSECTACIONES**

- Con insecticidas inocuos para los mamíferos
- Y de acción prolongada

• **DESRATIZACIONES**

- Colocando los cebos fuera del alcance de nuestros mamíferos domésticos

• **PROTECCIONES PAJAROS**

CONTRA

- **Colocando en la explotación dispositivos que impidan el acceso de los pájaros al interior de la explotación**
- **Se minimizarán así :**
 - **Las diarreas neonatales y**
 - **Las incidencias de coccidios**

SOBRE LOS ANIMALES

- **SOBRE LOS PERROS Y GATOS DE LAS EXPLOTACIONES**
 - Evitar la presencia masiva de gatos silvestres (no controlados por nosotros) en las explotaciones
 - Desparasitar a los perros y gatos, de nuestra propiedad, cada 45 días contra nematodos y cestodos
 - Evitar que consuman animales muertos

- **Se evitará así el contagio de quistes hidatídicos al ser humano**
- **Para las explotaciones de rumiantes se evitaran las cenurosis en el rebaño, también llamadas “MORRAS”**

• **SOBRE LOS ANIMALES RECIÉN NACIDOS**

– **En rumiantes**

- Desinfección del cordón umbilical
- Administración de vitaminas AD3 y E
- Administración de selenio, durante la 1ª semana de vida
- Control de las parideras para evitar hacinamientos y pérdidas de la madre


• **En porcino**

- Desinfección del cordón umbilical
- Administración de Hierro, repetición en 7 días
- Corte terapéutico de dientes y rabo, evita lesiones en madres y el canibalismo
- Habitáculo caliente y seco
- Presencia de materiales manipulables por el lechón

• **SOBRE ANIMALES ADULTOS**


–En porcino

- » Vacunación en sábana contra Aujeszky
- » Desparasitación previa a la vacunación
- » Vacunaciones preventivas en función de las patologías de cada granja
- » Realización de las campañas de erradicación y control de PPC, PPA, Vesicular y Aujeszky

- 
- The background of the slide features several slices of citrus fruit, likely oranges or lemons, arranged in a circular pattern. The slices are shown in a light, semi-transparent style. In the lower right quadrant, there is a detailed illustration of a beetle, possibly a scarab, shown from a top-down perspective. The beetle has a dark, segmented body with a lighter-colored head and legs.
- » Desparasitaciones externas
 - » Cuarentenas de la reposición, con procedencia de granjas exentas de Aujeszky o de la misma granja con chequeo previo.

• En rumiantes

- Vacunación contra Brucelosis a TODA la reposición
- Vacunaciones preventivas contra Enterotoxemias Y Aborto Paratífico
- Desparasitaciones cada 6 meses, preferentemente previas a una vacunación
- Para caprino, vacunación contra Agalaxia Contagiosa

- 
- The background of the slide features several slices of citrus fruit, likely oranges or lemons, arranged in a circular pattern. The slices are rendered in a light, semi-transparent style. In the lower right quadrant, there is a detailed, metallic-looking egg, possibly a chicken egg, which is also semi-transparent and appears to be part of the overall design.
- Realización sistemática de la campañas de erradicación de Brucelosis y Tuberculosis
 - Desparasitaciones externas

SOBRE HABITOS DE MANEJO

- **NORMAS BÁSICAS PARA EL GANADERO**

- **ROPA:**

- Diferente a la utilizada diariamente
- Distinta para diferentes explotaciones

- **BOTAS Y ZAPATOS**

- Únicos para cada explotación
- Desinfección del calzado de toda persona ajena a la granja

– **MANOS:**

- Lavadas antes y después del contacto con los animales
- Utilización de guantes tanto en partos como en la curación de heridas SIEMPRE

– **ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA HIGIENE EN LAS MANOS:**

- Evitaremos contagios bacterianos o Víricos, Micosis o Sarnas...

– **LLEVAR UN CONTROL DE LAS VISITAS A LA EXPLOTACION,** ya sea de pienso, veterinarios, recogida cadáveres, vecinos...

• **IMPOTANTE PARA LOS ANIMALES**

- **AGUA DE BEBIDA:**

- Limpia, potable y no contaminada con heces
- No al sol
- Ab libitum

- **CUIDADO CON LAS FUMIGACIONES, PUEDEN OCURRIR INTOXICACIONES**

- Control de las fumigaciones realizadas en los cultivos donde los animales pastan
- Cuidado con los desinfectantes y desinsectantes utilizados en las explotaciones



– LAZARETO:

- Para separar animales enfermos de sanos
- Para que los nuevos animales se habitúen al micro-ecosistema de la granja

– VADOS SANITARIOS DE ENTRADA

- SIEMPRE LLENOS CON DESINFECTANTE
- Aunque, para algunas especies ganaderas, NO SON OBLIGATORIOS, es recomendable su existencia para desinfectar las ruedas de los vehículos, a la ENTRADA y a la SALIDA